



OPIEKA NAD TATUAŻEM

by

artist@bushmentattoo.pl

1. Osuszyć tatuaż poprzez delikatne poklepywanie.
2. Założyć jałowy opatrunek, nigdy folię, na co najmniej 2 godziny! Jeśli chcesz zamienić świeży tatuaż w pożywkę dla bakterii-owiń go folią przezroczystą! **NIGDY NIE NALEŻY OWIJAĆ TATUAŻY W TEN SPOSÓB!** Metoda ta została zapoczątkowana przez brat motocyklową na zlotach w latach 1970-1980, gdzie uciążliwe było wielokrotne odklejanie opatrunku ze świeżego tatuażu, a przecież każdy kumpel chciał ten nowy tatuaż zobaczyć. Niestety wciąż pokutuje wśród tatuażystów w Polsce i na świecie. A już od dawna Alliance of Professional Tattooists uważa tą metodę nie tylko za archaiczną ale i niebezpieczną! Zabronione jest też jej stosowanie na poważanych konwencjach i zlotach. Polecają **TYLKO** jałowe opatrunki, które należy regularnie zmieniać, 2-3 razy/dobę i utrzymać 1-2 dni.
3. Istnieją dwie szkoły co do stosowania maści nawilżająco-łagodzących: jedna mówi stosować maść niedługo po procedurze, druga dopiero po 24-48h. Osobiście polecam inny sprawdzony sposób, przez wielu uważany za „oldschoolowy”, ale z obserwacji działa najlepiej:
 - (a) przez pierwsze 3-4 dni nie stosować żadnych mazideł, dać się świeżej ranie zagoić;
 - (b) rozpocząć smarowanie maścią przy pierwszych oznakach łuszczenia się naskórka (co występuje praktycznie zawsze). Polecany szczególnie Bepanthen w maści, przykrywając lekką warstwą powierzchnię tatuażu 3 razy dziennie. Nie stosujemy maści antybakteryjnych, ponieważ mają właściwości podrażniające, nie ma też wskazań do ich stosowania.
4. Tatuaż jest wstępnie zagojony po 1-2 tygodniach, a całkowicie nawet do 6-8 tygodni. Należy unikać długiego moczenia i kąpieli, w tym słonecznych, sauny a także sportów, które mogą nadwyreżać skórę, w tym nadużywania różnych substancji... Brać prysznic i przemywać tatuaż letnią bądź chłodną wodą z antybakteryjnym mydłem w płynie.
5. Nie skubać, nie trzeć, nie drapać łuszczącego się naskórka/strupków z tatuażu. Pozwolić im naturalnie zejść. I sukces murowany!
6. Niepokojące objawy typu: bardzo intensywne zaczerwienienie; tworzenie się zbiorników z żółtym płynem, pęcherzy; trzeszczenie (akumulacja gazu); sączenie ropy; intensywny ból; opuchlizna i/lub gorączka wymagają pilnej konsultacji lekarza.

